

## せきちゅうそくわん 脊柱測弯検診のお知らせ

脊柱測弯症は、成長期に発生するものが多く、ほとんど自覚症状もなく気がつきにくいいため、発見が遅れがちになることも少なくありません。そこで早期発見・早期治療のため、モアレ写真法による検査をおこないます。

### ◆一次検査（モアレ写真撮影）

日時：5月24日（火） 8：50～

対象：2年生及び、3年生で昨年度欠席もしくは経過観察だった人

場所：第Ⅱ理科室（楠公道路側プレハブ校舎2階）

服装：半袖体操服・ハーフパンツ

### ◆二次検査（X線撮影）は、第一中学校にて6月28日に実施の予定。

※対象者には、後日、詳細を連絡します。



モアレってなに・・・??



少しでも放射線の害から体（特に腰・腹部）を守るために開発されました。暗室で背中からおしりにかけての筋肉のつきかたを、等高線状に写して左右の違いを見る写真です。レントゲンのように骨そのものを写すのではなく、あくまでも外見上の違いを知る方法です。

### 気をつけて！！

- ①背中を写すので、髪の毛の長い人は束ねておくようにしてください。
- ②動いて筋肉の高さに左右差が出てしまうと、「要二次検査」と判定されてしまいます。医療機関の人の言うことをよく聞いて、力を抜いてリラックスして受けるようにしてください。

### 脊柱測弯症って??

立った姿勢で後ろから見ると、背骨が垂直になっているのが通常ですが、これが左右どちらかに曲がっている場合があります（右図）。

脊柱側弯症は、早く発見して治療を受けることが一番大切です。そのため、学校の健康診断のなかにも取り入れられています。

